

**仅供科研使用，不得用于临床检验。**

# 猪流行性腹泻病毒抗体（PEDV Ab）检测试剂盒（ELISA） 说明书

## 【产品名称】

通用名称：猪流行性腹泻病毒抗体（PEDV Ab）检测试剂盒（ELISA）

英文名称：Test Kit for Antibodies to Porcine Epidemic Diarrhea Virus (ELISA)

## 【包装规格】

96 人份/盒

## 【预期用途】

**仅供科研使用，**猪流行性腹泻是由猪流行性腹泻病毒（Porcine Epidemic Diarrhea Virus, PEDV）引起的猪的一种高度接触性肠道传染病，以呕吐、腹泻和食欲下降为基本特征，各种年龄的猪均易感。

本试剂盒用于检测猪血清、血浆中猪流行性腹泻病毒抗体，可用于猪流行性腹泻病毒疫苗免疫效果评价。

## 【检验原理】

本试剂盒由预包被猪流行性腹泻病毒重组 N 蛋白的酶标板、酶标记物及其他配套试剂组成，应用酶联免疫法（ELISA）原理检测猪血清、血浆样本中猪流行性腹泻病毒抗体。实验时在酶标板中加入对照血清和待检样本，经温育后若样品中含有猪流行性腹泻病毒抗体，则将与酶标板上抗原结合，经洗涤除去未结合的其他成分后；再加入酶标记物，与酶标板上抗原抗体复合物发生特异性结合；再经洗涤除去未结合的酶标记物，在孔中加 TMB 底物液，与酶结合物反应形成蓝色产物，显色深浅与样品中的特异性抗体含量成正相关；加入终止液终止反应后，产物变为黄色；用酶标仪在 450nm 波长测定各反应孔中的吸光值，即可知样品是否含有猪流行性腹泻病毒抗体。

## 【主要组成成分】

### 主要成分

| 组分       | 数量       | 主要成分                 |
|----------|----------|----------------------|
| 阴性对照     | 1.0 mL×1 |                      |
| 阳性对照     | 1.0 mL×1 |                      |
| 包被微孔板    | 96T      | 预包被固相抗体              |
| HRP 标记物  | 10mL     | HRP 标记的检测抗体          |
| 样本稀释液    | 50mL     |                      |
| 底物液 A    | 6mL      | 过氧化脲工作液              |
| 底物液 B    | 6mL      | TMB 工作液              |
| 终止液      | 6mL      | --                   |
| 20×浓缩洗涤液 | 40mL     | 含 0.15%Tween20 的 PBS |
| 说明书      | 1 份      | --                   |
| 自封袋      | 1 个      | --                   |
| 不干胶      | 2 片      | --                   |

### 需要但未提供的材料及耗材

- 1、酶标仪
- 2、精密移液器及一次性吸头
- 3、蒸馏水
- 4、洗瓶或者自动洗板机
- 5、37℃水浴锅或恒温箱
- 6、500ml 量筒
- 7、无粉一次性乳胶手套

## 【储存条件及有效期】

- 1、2–8℃保存，切勿冷冻，有效期 6 个月。
- 2、开封使用后，包被微孔板放入带有干燥剂的自封袋中，密闭自封袋，并将全部试剂放回2–8℃冰箱。
- 3、开封后，按照建议的条件保存，校准品、包被微孔板和 HRP 标记抗体，有效期为 14 天，仅供科研使用，不得用于临床诊断。

其他成分在标签标明的有效期内是稳定的。

### 【适用仪器】

半自动的酶标仪，如 Thermo MK3，或者国产酶标仪。

### 【样品准备】

1. 取动物全血按常规方法制备血清，要求血清清亮，无溶血、无污染。样品 1 周内可于 2~8℃保存，长期需置-20℃保存。
2. 用样品稀释液将待检血清按 40 倍稀释（如 5  $\mu$ l 血清加入 195  $\mu$ l 样品稀释液中，混匀）。阴、阳性对照不用稀释。
3. 浓缩洗涤液使用前应恢复至室温使沉淀溶解，然后用蒸馏水或去离子水作 20 倍稀释成工作洗涤液(如 19 份蒸馏水或去离子水+1 份浓缩洗涤液)。

### 【检验方法】

1. 使用前将试剂盒置室温 30 分钟，恢复至室温。
2. 取所需用量酶标板条，设空白对照 1 孔、阴性/阳性对照各 2 孔，未用的板条尽快密封，2~8℃保存。
3. 空白对照孔加样品稀释液 100  $\mu$ l；阴、阳性对照孔分别加入阴、阳性对照 100  $\mu$ l；样品孔每孔加入稀释后的样品 100  $\mu$ l。
4. 混匀，盖好盖板膜，置 37℃（推荐水浴）避光反应 30 分钟。
5. 甩去孔内液体，每孔加 350  $\mu$ l 工作洗涤液，静置 30 秒后弃去，重复洗涤 5 次，最后一次拍干。
6. 每孔加酶标记物 100  $\mu$ l（空白孔除外）。盖好盖板膜，置 37℃避光反应 30 分钟。
7. 洗涤，同步骤 5。
8. 每孔依次加底物液 A、底物液 B 各 50  $\mu$ l，混匀，盖好盖板膜，置 37℃避光反应 10 分钟。
9. 每孔加终止液 50  $\mu$ l，混匀，于 450nm(可用 630nm 作参比波长) 测定各孔吸光值 (A 值)，无参比波长用空白孔调零(即所有孔吸光值减去空白孔吸光值)。

### 【参考值】

实验正常的情况下，阴性对照 $\leqslant 0.10$ ，阳性对照 $\geqslant 0.6$ 。

## 【检验结果的解释】

1. 样品 A 值  $\geq 0.38$  为阳性；样品 A 值在 0.2 到 0.38 之间为可疑；样品 A 值  $< 0.2$  为阴性。
2. 本实验结果为阴性或可疑时表明猪只抗体水平不足，建议补打相应疫苗。

## 【试验方法的局限性】

该试验仅作为定性检测猪血清、血浆中猪流行性腹泻病毒抗体，根据 A 值高低可作抗体水平强、中、弱的粗略评估。

## 【注意事项】

### 生物安全

- 1、检测必须符合实验室管理规范的规定，严格防止交叉污染，所有样品、洗弃液和各种废弃物都应按照传染物进行处置。
- 2、试剂盒的液体组分中，含有 proclin-300 防腐剂，可能引起皮肤过敏反应，避免吸入烟雾与皮肤接触。
- 3、底物液对皮肤、眼睛和上呼吸道有刺激作用，避免吸入烟雾。戴上防护手套，实验完成后彻底洗手。

### 技术提示

- 1、混合蛋白溶液时，避免起泡。
- 2、加校准品与样本时，每个校准品浓度和样本都要更换移液枪头，公共组分应该悬臂加样，避免交叉污染。
- 3、合适的温育时间，和充分的洗涤步骤，是保证实验结果准确性的必要条件。
- 4、底物溶液为无色液体，保存过程中变为蓝色，代表底物溶液已经失效，不得使用。
- 5、终止液加样顺序与底物溶液加样顺序一致，加入终止液后，蓝色底物产物，会瞬间变为黄色。
- 6、实验中，用剩的板条，应立即放回自封袋中，密封（低温干燥）保存。
- 7、所有液体组分，使用前充分摇匀，严格按照说明书标明的时间、加样量及加样顺序进行温育操作。

### 废物处理

所有使用或未使用的试剂，所有污染性的一次性材料，应当遵循传染性或潜在传染性产品的处理程序，每个实验室都有责任根据其实验的类型和危险性级别，进行废物和污物的处理，同时要严格依照有关规定对待所有的废物和污物。  
仅供科研使用，不得用于临床诊断。